

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Risorse Umane
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Tel. 0373-280.1
e-mail: personale@asst-crema.it

CONCORSO PUBBLICO A N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI OFTALMOLOGIA

CREMA 09/11/2020

ALLEGATO N. 2

TRACCE DELLE PROVE SCRITTE

PROVA SCRITTA N. 1

1. Nell'attacco acuto di glaucoma la pupilla appare:
 - a. normo-reagente alla luce
 - b. miotica
 - c. midriatica
 - d. non reagente alla luce
 - e. sia risposta "c" che risposta "d"

2. La plica semilunare è una formazione:
 - a. corneale
 - b. congiuntivale
 - c. iridea
 - d. palpebrale
 - e. orbitaria

3. Il cheratocita è una cellula:
 - a. Retinica
 - b. Congiuntivale
 - c. Corneale
 - d. Del cristallino
 - e. Iridea

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Risorse Umane
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Tel. 0373-280.1
e-mail: personale@asst-crema.it

4. Un carcinoma a sede oculare é
 - a. una neoplasia benigna
 - b. un processo flogistico
 - c. una neoplasia epiteliale maligna
 - d. una neoplasie mesenchimale maligna
 - e. una neoplasia neurogliale
5. L'ipermetropia favorisce l'insorgenza di
 - a. Blefarocongiuntiviti croniche
 - b. Cataratta complicata
 - c. Astenopie accomodative
 - d. Sia la risposta "a" che la risposta "b"
 - e. Sia la risposta "a" che la risposta "c"
6. Quale tra i seguenti enzimi è in grado di attuare la lisi della zonula di Zinn
 - a. Ialuronidasi
 - b. Alfa-chimotripsina
 - c. Tripsina
 - d. Streptochinasi
 - e. Pتيالina
7. I nevi della coroide
 - a. Sono rari
 - b. Sono abbastanza comuni
 - c. Sono tipici solo di alcune razze
 - d. Non è descritta patologia melanocitaria nella coroide
 - e. Vanno sempre asportati per il rischio di evoluzione melanomatosa
8. In quale delle seguenti situazioni il recupero della visione è più frequente
 - a. meningioma della guaina del nervo ottico trattato con escissione chirurgica
 - b. neurite ottica demielinizzante senza trattamento
 - c. neuropatia ottica traumatica trattata con alte dosi di corticosteroidi
 - d. occlusione dell'arteria centrale della retina trattata con paracentesi
 - e. degenerazione maculare senile con atrofia a carta geografica coinvolgente la fovea
9. Nel morbo di Wilson una lesione caratteristica é

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Risorse Umane
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Tel. 0373-280.1
e-mail: personale@asst-crema.it

- a. la cheratite a bandelletta
 - b. l'anello corneale di Kayser-Fischer
 - c. il gerontoxon
 - d. la colorazione giallastra della congiuntiva
 - e. sia la risposta "c" che la risposta "d"
10. Una riduzione di profondità della camera anteriore può essere dovuta
- a. a glaucoma acuto
 - b. a perforazione della cornea
 - c. a distacco della coroide
 - d. a tutte le precedenti condizioni
 - e. a miopia elevata
11. La leucotrichia è
- a. una decolorazione congenita delle ciglia
 - b. una decolorazione acquisita delle ciglia
 - c. assenza di ciglia
 - d. malformazione di impianto delle ciglia
 - e. sia la risposta "b" che la risposta "d"
12. Il muscolo di Muller della palpebra superiore è innervato da
- a. fibre simpatiche
 - b. fibre parasimpatiche
 - c. fibre extrapiramidali
 - d. fibre motrici del III
 - e. fibre motrici del VII
13. Quale delle seguenti degenerazioni retiniche periferiche presenta il maggior rischio regmatogeno
- a. degenerazione pavimentosa
 - b. degenerazione a palizzata
 - c. white without pressure
 - d. white with pressure
 - e. degenerazione cistoide
14. La superficie che unisce tutti i punti dello spazio che per una data distanza si proiettano su punti corrispondenti retinici viene definita

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Risorse Umane
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Tel. 0373-280.1
e-mail: personale@asst-crema.it

- a. Oroptero
 - b. Caustica
 - c. Conoide di Sturm
 - d. Area di Panum
 - e. Punto “zero”
15. L'elettroretinogramma è estinto
- a. nell'atrofia ottica
 - b. nella degenerazione tapeto-retinica
 - c. nelle degenerazioni maculari
 - d. nelle emianopsie
 - e. sia la risposta “a” che la risposta “c”
16. La presbiopia è affezione propria
- a. dell'infanzia
 - b. dell'adolescenza
 - c. della maturità
 - d. della senilità
 - e. sia la risposta “c” che la risposta “d”
17. Le scleriti sono affezioni sovente concomitanti a processi patologici a carico
- a. del tessuto connettivo
 - b. delle ghiandole endocrine
 - c. del sistema nervoso
 - d. del tessuto linfatico
 - e. delle vie lacrimali
18. Nel glaucoma cronico semplice il primo danno campimetrico è costituito da
- a. aumento della macchia cieca
 - b. quadrantopsia
 - c. denudamento della macchia cieca
 - d. emianopsia
 - e. scotoma centrale relativo

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Risorse Umane
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Tel. 0373-280.1
e-mail: personale@asst-crema.it

19. Il torcicollo oculare è atteggiamento compensatore di
- diplopia monoculare
 - diplopia binoculare
 - confusione
 - falsa localizzazione dell'immagine
 - di nessuna delle condizioni precedenti
20. Quale vitamina è particolarmente abbondante nel cristallino
- Vit A
 - Vit. B6
 - Vit. C
 - Vit. E
 - Vit. K

PROVA SCRITTA N. 2

1. Nella cheratite herpetica è presente più frequentemente
- Iperestesia corneale
 - Ipoestesia corneale
 - Normoestesia corneale
 - Ipoestesia congiuntivale
 - Parestesia
2. L'ipermetropia favorisce l'insorgenza di
- Blefarocongiuntiviti croniche
 - Cataratta complicata
 - Astenopie accomodative
 - Sia la risposta "a" che la risposta "b"
 - Sia la risposta "a" che la risposta "c"
3. Un rhabdomyosarcoma oculare è
- un processo degenerativo
 - un tumore benigno dei tessuti molli
 - una neoplasia maligna a differenziazione muscolare

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Risorse Umane
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Tel. 0373-280.1
e-mail: personale@asst-crema.it

- d. una neoplasia maligna a differenziazione cartilaginea
 - e. una neoplasia maligna a differenziazione linfo-ghiandolare
4. Col termine “deuteranopia” si definisce
- a. la visione doppia
 - b. l’alterazione della visione dei colori sull’asse rosso-verde
 - c. l’alterazione della visione dei colori sull’asse giallo-blu
 - d. la visione notturna
 - e. la visione diurna
5. Il senso cromatico è funzione
- a. scotopica
 - b. fotopica
 - c. dei bastoncelli
 - d. dei coni
 - e. sia la risposta “b” che la risposta “d”
6. Il segno pupillare di Argyll-Robertson è segno di
- a. lue cerebrale
 - b. leucoencefalite
 - c. tumore cerebellare
 - d. meningioma
 - e. nessuna delle precedenti
7. La visione binoculare
- a. è propria dell’età adulta
 - b. si sviluppa nella prima infanzia
 - c. si sviluppa nella seconda infanzia
 - d. è innata filogeneticamente
 - e. è esclusivamente dei primati
8. La cheratocentesi è
- a. Apertura della C. A
 - b. Prelievo bioptico corneale
 - c. Disepitelizzazione corneale
 - d. Intervento antiglaucomatoso
 - e. Degenerazione corneale congenita

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Risorse Umane
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Tel. 0373-280.1
e-mail: personale@asst-crema.it

9. Nelle degenerazioni maculari senili il visus
- è abolito
 - è ridotto
 - è conservato
 - è deformato
 - sia la risposta “b” che la risposta “d”
10. Quali dei seguenti sintomi può essere presente nella malattia di Vogt-Koyanagi-Harada
- uretrite
 - congiuntivite
 - vitiligine
 - afte orali
 - enterit
11. L'essudato cotonoso è espressione di
- alterazione della barriera emato-retinica interna
 - alterazione della barriera emato-retinica esterna
 - ischemia retinica
 - ischemia coroideale acuta
 - ischemia coroideale cronica
12. le ghiandole di Krause sono
- lacrimali
 - sebacee
 - a secrezione endocrina
 - sudoripare
 - caliciformi
13. Nel morbo di Wilson una lesione caratteristica è
- la cheratite a bandelletta
 - l'anello corneale di Kaiser-Fleischer
 - il gerontoxon

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Risorse Umane
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Tel. 0373-280.1
e-mail: personale@asst-crema.it

- d. la colorazione giallastra della congiuntiva
 - e. sia la risposta “c” che la risposta “d”
14. Quale delle seguenti affermazioni a proposito del pucker maculare NON è corretta?
- a. è una membrana fibrocellulare avascolare che prolifera sulla superficie retinica interna
 - b. crea trazione tangenziale sulla macula
 - c. causa perdita della visione centrale con o senza metamorfopsie
 - d. può essere presente edema maculare
 - e. è caratterizzato da emorragie sottoretiniche
15. Quale delle seguenti degenerazioni retiniche periferiche presenta il maggior rischio regmatogeno
- a. degenerazione pavimentosa
 - b. degenerazione a palizzata
 - c. white without pressure
 - d. white with pressure
 - e. degenerazione cistoide
16. All’esame fluoroangiografico una emorragia appare come
- a. area iperfluorescente nelle fasi precoci
 - b. area ipofluorescente che permane tale nel corso dell’esame
 - c. area ipofluorescente tardiva
 - d. area iperfluorescente precoce
 - e. nessuna alterazione
17. Le metamorfopsie sono segno di
- a. astigmatismo corneale
 - b. astigmatismo lenticolare
 - c. addensamento vitreale
 - d. patologia retinica periferica
 - e. patologia retinica centrale
18. La visione binoculare comprende
- a. la percezione simultanea

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Risorse Umane
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Tel. 0373-280.1
e-mail: personale@asst-crema.it

- b. la fusione
- c. la stereopsi
- d. sia la risposta “a” che la risposta”b”
- e. sia la risposta “a” che la risposta “b” che la risposta “c”

19. Le paralisi dello sguardo sono dovute a

- a. lesioni dei nuclei oculomotori
- b. lesioni dei nervi periferici
- c. lesioni sovranucleari
- d. lesioni della corteccia occipitale
- e. ptosi palpebrale congenita

20. Il muscolo di Riolano è contenuto nella struttura

- a. della palpebra
- b. della sclera
- c. dell’iride
- d. della capsula di Tenone
- e. della coroide

PROVA SCRITTA N. 3

1. L’ipermetropia oltre allo sforzo visivo implica tendenzialmente

- a. fotofobia
- b. emeralopia
- c. discromatopsia
- d. fosfeni
- e. metamorfopsia

2. Sono funzione del muscolo retto laterale

- a. la depressione del globo
- b. l’extorsione
- c. l’abduzione
- d. l’intorsione
- e. l’adduzione

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Risorse Umane
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Tel. 0373-280.1
e-mail: personale@asst-crema.it

3. Quale tra i seguenti enzimi è in grado di attuare la lisi della zonula di Zinn
 - f. Ialuronidasi
 - g. Alfa-chimotripsina
 - h. Tripsina
 - i. Streptochinasi
 - j. Pتيالina

4. L'essudato cotonoso è espressione di
 - a. alterazione della barriera emato-retinica interna
 - b. alterazione della barriera emato-retinica esterna
 - c. ischemia retinica
 - d. ischemia coroideale acuta
 - e. ischemia coroideale cronica

5. Il disco di Placido è uno strumento atto a
 - a. verificare la regolarità della curvatura corneale
 - b. determinare l'entità del vizio di refrazione
 - c. individuare l'occhio dominante
 - d. valutare il grado di binocularità
 - e. sia la risposta "b" che la risposta "c"

6. L'elevatore della palpebra superiore è innervato da
 - a. III
 - b. IV
 - c. VI
 - d. Simpatico
 - e. parasimpatico

7. La sclerosi multipla determina nell'occhio
 - a. emianopsia
 - b. uveite
 - c. neurite ottica
 - d. distrofia corneale
 - e. cataratta

8. L'emeralopia essenziale è affezione su basi

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Risorse Umane
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Tel. 0373-280.1
e-mail: personale@asst-crema.it

- a. geniche eredo-familiari
 - b. tossico-iatrogene
 - c. dismetaboliche
 - d. infettive
 - e. disendocrine
9. Lo xantelasma si riscontra
- a. nella congiuntiva
 - b. nella cornea
 - c. nella cute palpebrale
 - d. nella sclera
 - e. nella capsula di Tenone
10. La cheratocongiuntivite epidemica è causata da
- a. diplococco
 - b. tipo 8 del gruppo adenovirus
 - c. streptococco
 - d. funghi tipo “Candida”
 - e. “Proteus Vulgaris”
11. Il muscolo di Horner
- a. costituisce la parte lacrimale del muscolo orbicolare
 - b. è innervato dal terzo n.c.
 - c. origina dalla cresta lacrimale posteriore
 - d. sia risposta “a” che risposta “c”
 - e. è innervato dal parasimpatico oculare
12. Nell’attacco acuto di glaucoma è presente
- a. iperemia pericheratica
 - b. iperemia congiuntivale a settore
 - c. iperemia congiuntivale epibulbare
 - d. iperemia parossistica

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Risorse Umane
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Tel. 0373-280.1
e-mail: personale@asst-crema.it

- e. iperemia a “caput medusae”
13. Una dose terapeutica di morfina causa
- Diminuzione della motilità del tratto gastro-intestinale
 - Stimolazione del S.N.C.
 - Miosi
 - Iperventilazione
 - Sia risposta “a” che risposta “c”
14. L’iridectomia periferica è
- chirurgica
 - congenita
 - effettuata a scopo ottico
 - effettuata per favorire il deflusso dell’acqueo
 - sia risposta “a” che risposta “d”
15. Sono funzione del muscolo retto inferiore
- depressione del globo
 - adduzione
 - extorsione
 - sia risposta “a” che risposta “c”
 - sia risposta “a” che risposta “b” che risposta “c”
16. Quale delle seguenti ossa NON contribuisce alla formazione dell’orbita?
- osso nasale
 - osso etmoidale
 - osso frontale
 - osso sfenoide
 - osso mascellare
17. A quale dei seguenti vizi di refrazione è più comunemente associato il glaucoma ad angolo stretto

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Risorse Umane
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Tel. 0373-280.1
e-mail: personale@asst-crema.it

- a. miopia
 - b. ipermetropia
 - c. astigmatismo secondo regola
 - d. astigmatismo contro regola
 - e. astigmatismo misto
18. Le radiazioni visibili dello spettro luminoso hanno una lunghezza d'onda compresa tra
- a. 400 e 700 nanometri
 - b. 100 e 700 nanometri
 - c. 600 e 800 nanometri
 - d. 700 e 800 nanometri
 - e. 100 e 500 nanometri
19. I cilindrassi, che costituiscono le fibre del nervo ottico, da quali cellule derivano
- a. dalle cellule bipolari
 - b. dalle cellule ganglionari
 - c. dai coni
 - d. dai bastoncelli
 - e. dalle cellule amacrine
20. Le ghiandole di Zeiss
- a. sono ghiandole sudorifere apocrine
 - b. sono ghiandole annesse ai follicoli ciliari
 - c. sono ghiandole sebacee tarsali
 - d. sono ghiandole mucipare
 - e. sono ghiandole lacrimali accessorie