

TAMPONE per Streptococco di gruppo B

أنبوب فحص خاص للمسحة العازلة إلى بكتيريا المكور العقدي من نوع ب

هناك حاجة إلى حاوي أو أنبوب فحص مُميّز وخاص لهذا الفحص ؛ والذي من الممكن إستلامه من مركز الحجز الوحيد فقط / CUP ؛ (وَيَجِبُ تخزينه والمُحافظة عليه على درجة الحرارة الجوية العادية ؛ أي على درجة حرارة الغرفة) .



يَجِبُ إجراء فحص المسحة العازلة للمكور العقدي بين الأسبوع ٣٥ - ٣٧ والأسبوع ٣٧ - ٣٧ من فترة الحمل / الحبل .

يَجِبُ إدخال العُودَة الماسحة والجامعة للمواد العُضوية (إن كانت تلك إفرازات أو بُراز) أولاً في داخل المِهْبَل ؛ وبعد ذلك في فَتْحَة الشَّرَج أو المَخْرَج (المَصْران المُستقيم) ، وفي كِلا الحالتين يجب إدخال عُودَة الفحص من مسافة ٢ إلى ٣ سم (٢ - ٣ سم) .

يَجِبُ وَضْع عُودَة الفحص بعد إخراجها في الأنبوب الخاص (وهو عبارة عن مَزْرَعَة تحتوي على مواد خاصة لِتَنمِيَة الجراثيم وِدِرَاسَتِها) ؛ وهو أيضاً وسيلة نقل آمنة وَوثيقة إلى المُختبر .

إذا تَمَّ تسليم أنبوب فحص المسحة العازلة إلى مُختبر التَّحاليل في اليوم التَّالي ؛ فيَجِبُ تخزين الأنبوب والمُحافظة عليه في البَرَاد أو الثَّلَاجَة .

مُلاحظة :

بِالإمكان طَلَب إجراء/عَمَل الفحص ؛ أو عملية إِستِخراج وَجَمْع العَيِّنات من المِهْبَل وَفَتْحَة الشَّرَج ؛ من قِبل المُوظَّفين الصَّحَّيين المُوجودين في صالة جِباية الدَّم وَجَمْع العَيِّنات وَالمُسْتَخْرَجات العُضوية الأخرى ، حيثُ يَكْفِي طَلَب ذلك من المُوظَّفين المُوجودين في الصَّالة صَبَاح نَفْس اليَوم . وَلَيْسَ هُناك حاجة إلى الحَجَز مُسَبِّقاً .

كريما ، تَشْرين الأول / شَوَّال / أكتوبر 2015

ترجمة الوسيط الثقافى : أحمد عابد