

I CONSIGLI POST VACCINAZIONE

Dopo la vaccinazione i genitori possono avere dei dubbi su cosa fare se il bambino ha dei disturbi.

Cerchiamo di rispondere alle domande più frequenti:

- **Il mio bambino è irrequieto. Cosa devo fare?**

Dopo la vaccinazione, i bambini possono essere particolarmente irrequieti o piangere poiché possono sentire dolore nella sede dell'iniezione o avere la febbre.

- Si può somministrare un farmaco, ad esempio paracetamolo, che aiuta a ridurre il dolore e la febbre;
 - Se lo stato di irrequietezza persiste per più di 24H consultare il pediatra.
-
- **La sede d'iniezione è calda, gonfia e arrossata. Che cosa devo fare?**
 - Applicare un panno pulito e fresco sulla zona dolorosa ed infiammata;
 - Se ritenete che il bambino abbia molto dolore perché reagisce alla minima pressione, potete somministrare il paracetamolo, secondo il peso del bambino, come descritto sul foglietto illustrativo.
-
- **Penso che il bambino abbia la febbre, cosa devo fare?**
 - Prima di tutto verificate se è vero e misurate la temperatura del bambino (preferibilmente ascellare);
 - Se il bambino ha la febbre
 - Dategli da bere in abbondanza,
 - Vestitelo in modo leggero senza coprirlo eccessivamente,
 - Somministrate il farmaco “paracetamolo”,
 - Se il bambino continua ad avere la febbre per oltre 24H, oppure se la febbre aumenta o il bambino presenta sintomi insoliti, consultate il pediatra o il pronto soccorso.